



B) VEGETAZIONE-BOSCHI




Boschi cedui matricinati di sclerofille sempreverdi con presenza di latifoglie decidue

1. Lecceta tipica a *Viburnum tinus*
2. Lecceta di transizione ai boschi di caducifoglie
3. Omolecceta con roverella delle zone interne




Fitocenosi di degradazione, in prevalenza macchie e garighe anche termofile costiere

1. macchia media mesomediterranea
2. macchia bassa mesomediterranea
3. macchia termomediterranea




Querceto termofilo di roverella con leccio e cerro

- Viburno tini-Quercetum ilicis* Riv. Martinez 1975 *pubescentosum* Br. Bl. 1952
- Fraxino omni-Quercetum ilicis* Horvatic (1956) 1958




1. Pineta dunale termomediterranea di Pino domestico
2. Pineta costiera di Pino marittimo
3. Pineta di Pino d'Aleppo



Sughereta specializzata



1. Ginepreto rupestre a *Juniperus phoenicea*
2. Ginepreto dunale a *Juniperus phoenicea* e *Juniperus oxicedrus* ssp *macrocarpa*



1. Boschi igrofili ripariali (saliceto e pioppeto ripario)
2. Boschi igrofili planiziali a prevalenza di latifoglie decidue su substrati limosi o argillosi umidi



Fitocenosi psammofile litoranee (Cakileto, Agropireto, Ammophileto, Crucianelleto, Sporoboletto)




1. Fitocenosi igrofile di depressioni palustri interdunali con prevalenza di giunchi
2. Fitocenosi igroalofile a dominanza di salicornie



Oliveti abbandonati con erbaio spontaneo di terofite in via di reinvazione ad opera di specie arbustive ed arboree sclerofilliche

C) USO DEL SUOLO AGRO-PASTORALE



Uso del suolo agro-pastorale